

Efecto de la incorporación de residuos de cosecha de tarwi (*Lupinus mutabilis* Sweet) en el sistema de cultivos y la recuperación de suelos de regiones andinas semiáridas de Cochabamba

Pablo Mamani; Juan José Calisaya

Fundación PROINPA

E mail: p.mamani@proinpa.org

Resumen. El estudio se llevó a cabo durante las campañas agrícolas 2014-2015 y 2015-2016, en comunidades del municipio de Anzaldo (Cochabamba), ubicadas a 3040 msnm. La precipitación del lugar es de 450 mm/año y su temperatura mínima y máxima es de 4°C y 23°C, respectivamente. Sus suelos son de escasa profundidad, baja fertilidad y escasa materia orgánica (0,9%). El presente estudio buscó determinar el efecto de la incorporación al suelo de los residuos de cosecha de tarwi, en el sistema de rotación tradicional de cultivos y en la recuperación de los suelos. Esta incorporación logra incrementar la productividad de papa en 51% y de quinua en 58%. En ambos cultivos, la combinación de rastrojo de tarwi con guano animal, logra incrementar aún más su rendimiento. También se determinó que esta incorporación incrementa la respiración del suelo, lo que sugiere que se genera mayor actividad microbiana debido al incremento de la materia orgánica del suelo (de 0,7% a 1,03%) lo que repercute en un mayor contenido de N (de 27 ppm a 40 ppm), P (de 8 ppm a 13 ppm) y K (0,25 a 0,35 meq/100 g de suelo). Por tanto, se sugiere promover la incorporación de los residuos de cosecha de tarwi, para favorecer al sistema de cultivos y la mejora del suelo.

Palabras clave: Edafología; Rotación de cultivos; Abono verde; Residuos de cosecha

Summary. **Incorporation effect of tarwi (*Lupinus mutabilis* Sweet) crop residues in crops system and soils recovery of semi-arid Andean regions of Cochabamba.** The study was carried out during the agricultural campaigns 2014-2015 and 2015-2016, in communities of the Municipality of Anzaldo (Cochabamba), located at 3040 meters above sea level. In that area, the precipitation is 450 mm/year and its minimum and maximum temperature is 4°C and 23°C, respectively. Its soils are of low depth, low fertility and scarce organic matter (0.9%). The present study sought to determine the effect of tarwi crop residues incorporation in soil, under the traditional crop rotation system and in the recovery of soils. This incorporation increases the potato productivity in 51% and quinoa in 58%. In both crops, the combination of tarwi stubble with animal guano increases its performance even more. It was also determined that this incorporation increases soil respiration, suggesting that greater microbial activity is generated due to the increase of soil organic matter (from 0.7% to 1.03%), affecting a higher content of N (from 27 ppm to 40 ppm), P (from 8 ppm to 13 ppm) and K (0.25 to 0.35 meq/100 g of soil). Therefore, it is suggested to promote the incorporation of tarwi crop residues, to favoring the crop system and soil improvement.

Keywords: Soil science; Crop rotation; Green manure; Harvest residues

Introducción

Las prácticas de manejo del cultivo, tales como la labranza, rotación de cultivos, incorporación de residuos de cosecha, pueden modificar la materia orgánica del suelo (Espinoza *et al.* 2007).

El mantenimiento de la materia orgánica del suelo regula favorablemente el ambiente físico, químico y biológico del suelo (Follet 2001, Spedding *et al.*, 2004). La variación de la fracción orgánica del suelo y la intensidad de laboreo, determinan la condición física del mismo (Eiza *et al.* 2005).

Estudios en suelos de textura similar, han demostrado que los suelos con alto contenido de materia orgánica, tienen significativamente mayor Capacidad de Agua Disponible que los suelos con menor materia orgánica (Hudson 1994).

Estudios de rotación de cultivos han mostrado efectos positivos sobre el mantenimiento de niveles altos de la materia orgánica del suelo (Campbell *et al.* 1996, Omay *et al.* 1997, Espinoza *et al.* 2007).

En la rotación de cultivos, las leguminosas juegan un papel importante en las fracciones de la materia orgánica del suelo, debido a su efecto sobre la relación C/N (Potter *et al.* 1998).

Desde épocas remotas se reconoce al lupino como mejorador de la fertilidad del suelo, fijador de nitrógeno atmosférico y buen extractor de los nutrientes de las capas profundas del suelo, debido a su desarrollo radicular profundo (Gross 1982, Barrera 2015).

El *Lupinus mutabilis* se adapta a condiciones de baja precipitación pluvial, sue-

los de baja fertilidad y a temperaturas entre -9.5°C y 28°C (Cifuentes *et al.* 2001).

Los sistemas de producción de las regiones andinas semiáridas de Cochabamba (Bolivia), se tornan cada vez más vulnerables a las presiones que ejercen los mismos productores sobre sus suelos, obligados por la sobrevivencia y los cambios en el clima, lo cual está alterando los patrones de manejo de los cultivos y del ganado (Oros *et al.* 2018).

Los suelos de estas regiones, se caracterizan por su baja profundidad, poca fertilidad, son sensibles a la erosión debido al bajo contenido de materia orgánica como consecuencia de la mínima capacidad de reposición de materia orgánica al suelo, debido a la cada vez menor población ganadera ovina, la cual aporta muy poco guano al sistema y porque los residuos de cosecha de cultivos predominantes como el trigo, son extraídos para alimentar a los animales o son comercializados para otras necesidades, y por tanto no son devueltos al suelo (PROINPA 2015).

Estas causas, junto al cambio climático, están agudizando la disminución gradual de la capacidad productiva de los suelos, cuyos principales indicadores, según Fonte y Vanek (2012), son:

- ⇒ Bajo contenido de materia orgánica: 0,5% a 2%
- ⇒ pH ácido: 4,5 a 6,5
- ⇒ Bajo contenido de nitrógeno y fósforo
- ⇒ Baja capacidad de intercambio catiónico: 3 a 10 meq/100 g de suelo
- ⇒ Poca profundidad: 15 a 25 cm

La correcta elección de una combinación de rotaciones, labranzas e incorporación de residuos, puede ser una herramienta útil para reducir los riesgos de degradación del suelo y para maximizar la producción con el mínimo compromiso para el ambiente.

Las interacciones entre los efectos de corto y largo plazo entre rotaciones, labranzas y otras prácticas, son tan estrechas y complejas, que generalmente es difícil separarlos y analizarlos individualmente. Por esta razón, es preferible analizar los sistemas de cultivo más que las prácticas aisladas, ya que este término las incluye junto con sus interacciones, dentro del contexto general del sistema de producción (Studdert y Echeverría 2000).

Si bien las leguminosas aportan al mejoramiento de la fertilidad de los suelos, los agricultores de la zona no tienen un conocimiento adecuado de esta práctica, debido a que el cultivo del tarwi presenta un desarrollo leñoso, dificultando su incorporación con tracción animal o manual, por lo que los agricultores tienden a quemar o extraer *el rastrojo* para utilizar como leña. Por otra parte, debido a la tasa de migración elevada y la demanda de mayor cantidad de mano de obra, la agricultura tiende a la mecanización, por lo que la incorporación de residuos de cosecha podría realizarse con maquinaria agrícola.

En este sentido, el objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de la incorporación de los residuos de cosecha de tarwi, en el sistema de rotación tradicional de cultivos, y en la recuperación de los suelos de la región alto andina semiárida de Anzaldo (Cochabamba).

Materiales y métodos

El estudio se llevó a cabo durante las campañas agrícolas 2014-2015 y 2015-2016. Los ensayos se establecieron en comunidades del municipio de Anzaldo (Cochabamba-Bolivia), ubicado a 62 km de la ciudad de Cochabamba, a una altitud de 3040 msnm y en las coordenadas 17°46'46" de latitud Sud y 65°55'56" de longitud Oeste. El clima durante el cultivo se caracteriza por una precipitación promedio de 450 mm/año y temperaturas que van de una mínima de 4°C a una máxima de 23°C.

Los suelos predominantes son de escasa profundidad con presencia de una roca dura continua (barrera física) y mucha pedregosidad, lo cual describe a un suelo de tipo Leptosoles Éutricos con algunos Cambisoles Éutricos y Dístricos en campos con suelos más profundos. Evaluaciones previas de la región (PROINPA 2012), muestran que los suelos son semi-ácidos (pH 5,7), de baja Conductividad Eléctrica (0,06 mmhos/cm) es decir no son salinos, muy baja CIC (6,22 meq/100 g) atribuible a su bajo contenido de materia orgánica (0,93%), consecuentemente un pobre contenido de N (0,06%). El P también es bajo (4,92 ppm) y su K moderado (0,91 meq/100 g).

En general son suelos Franco Arenosos a Franco Limosos y su densidad aparente es alta (1,51 g/cc) como producto de su compactación.

El primer año (2014-2015) se implantaron dos ensayos para ver el efecto de la incorporación al suelo, de residuos de cosecha (rastrojo) de tarwi (*Lupinus mutabilis*), sobre los cultivos de papa (*Solanum tuberosum* ssp. *andigena*) y quinua (*Chenopodium quinua*).

Se utilizaron parcelas donde un año antes (ciclo agrícola 2013-2014) se había cultivado tarwi, cuyos residuos de cosecha fueron incorporados al suelo según definía el tratamiento utilizado. Para cada cultivo se utilizó el diseño de Parcelas Divididas en Franjas, en Bloques Completos al Azar, con tres repeticiones.

La unidad experimental consistió de una parcela de 10 m de largo y 3 m de ancho. Dentro de cada unidad experimental se tomaron 3 sub muestras de 5 m². El Cuadro 1 describe los factores, niveles y tratamientos del estudio.

Las incorporaciones del rastrojo de tarwi se realizaron después de la cosecha del grano. Para la incorporación, se utilizó tracción mecánica, con rastra de disco para el picado, y arado de disco para su incorporación. El efecto de la incorporación de rastrojo de tarwi se evaluó en los cultivos de quinua y papa en la campaña 2014-2015 y sólo papa en la campaña 2015-2016, debido a que es un cultivo importante en el sistema de Anzaldo.

Para la siembra de papa y quinua, la apertura de surcos se realizó con yunta, manteniendo una distancia de 70 cm entre surcos. La densidad de siembra fue de 12 kg/ha de quinua y 32 qq/ha de papa.

El guano ovino se aplicó durante la siembra a razón de 5 t/ha. El aporque y desmalezado se realizaron con yunta, a los 30 días después de la emergencia.

El segundo ciclo agrícola (2015 - 2016), en un sitio diferente, se repitió el ensayo de incorporación de residuos de cosecha de tarwi, para ver esta vez su efecto solo sobre el cultivo de papa.

Se utilizaron parcelas donde un año antes (ciclo agrícola 2014-2015), en una parte se había sembrado tarwi y otra parte donde se dejó el terreno en descanso.

También se utilizó el diseño de Parcelas Divididas en Franjas en Bloques Completos al Azar, con tres repeticiones. El Cuadro 2 describe los factores, niveles y tratamientos del estudio.

Cuadro 1. Descripción del diseño experimental y los tratamientos utilizados en el ciclo agrícola 2014 – 2015 para los estudios en papa y quinua

Ciclo agrícola 2013 / 2014	Año 2014 – 2015: Diseño experimental: Parcelas Divididas en Bloques Completos al Azar		
	Factor: "rastrojo de tarwi"(parcela principal)	Factor: "guano ovino" (sub parcela)	Tratamientos
Parcela con tarwi	Sin incorporación	Sin guano	T1 = Sin incorporación y sin guano
		Con guano	T2 = Sin incorporación y con guano
	Con incorporación	Sin guano	T3 = Con incorporación y sin guano
		Con guano	T4 = Con incorporación y con guano

Se utilizaron parcelas donde en el ciclo agrícola anterior (2013 - 2014) se cultivó tarwi

Cuadro 2. Descripción del diseño experimental y los tratamientos utilizados en el ciclo agrícola 2015 – 2016 para el cultivo de papa

Ciclo agrícola 2014 / 2015	Año 2015 – 2016: Diseño experimental: Parcelas Divididas en Bloques Completos al Azar		
	Factor: "rastreo de tarwi"(parcela principal)	Factor: "guano ovino"(sub parcela)	Tratamientos
Parcela con tarwi	Con tarwi y sin incorporación	Sin guano	T1 = Sin incorporación y sin guano
		Con guano	T2 = Sin incorporación y con guano
	Con tarwi y con incorporación	Sin guano	T3 = Con incorporación y sin guano
		Con guano	T4 = Con incorporación y con guano
Parcela en descanso	Sin tarwi y sin incorporación	Sin guano	T5 = Sin tarwi y sin guano
		Con guano	T6 = Sin tarwi y con guano

Se utilizaron parcelas en descanso y parcelas donde en el ciclo agrícola anterior (2014 - 2015) se cultivó tarwi

La incorporación y el manejo del cultivo fueron similares al primer año. En ambos años, la variable de evaluación en los cultivos, fue el rendimiento y en el caso del suelo, la respiración y otras variables de laboratorio (K intercambiable, materia orgánica total, N total y P disponible), para lo cual se tomaron muestras de suelo durante el desarrollo del cultivo.

El rendimiento de la quinua y la papa se analizó con el *Proc Mixed* del SAS ® (2008) y una vez determinadas las diferencias, se realizó la comparación de medias con el estadístico "t", al 95% de probabilidad estadística.

Resultados y discusión

La Figura 1 muestra el efecto de los residuos de cosecha de tarwi incorporados al suelo (rastreo de tarwi), sobre los cultivos de papa y quinua, como potenciales alternativas en la rotación de cultivos en dos ecoregiones de Anzaldo.

Como testigo referencial también se incluye al guano ovino. En papa claramente existe un efecto positivo del rastreo de tarwi, principalmente cuando se acompaña con guano. En quinua, el rastreo también incrementa su productividad, aún si no va acompañado con guano. En ambos cultivos, la combinación de rastreo de tarwi con guano, genera mayor productividad.

Una manera indirecta de medir la actividad microbiana del suelo es medir su respiración. El efecto del rastreo de tarwi y el guano ovino sobre la respiración del suelo durante el desarrollo de los cultivos de papa y quinua, se muestra en la Figura 2.

En las figuras 1 y 3, las letras mayúsculas comparan las medias del factor "rastreo de tarwi" (parcela principal) mientras que las letras minúsculas comparan las medias del factor "guano ovino" (sub parcela).




Figura 1. Efecto de la incorporación de rastrojo de tarwi (*L. mutabilis*) en la productividad de papa y quinua en las ecoregiones “planicie alta y seca” (comunidad Muña Mayu) y “ladera media” (comunidad Tijraska) en Anzaldo, en el ciclo agrícola 2014-2015

Letras iguales son estadísticamente similares al 95% de probabilidad




Figura 2. Tasa de respiración del suelo por efecto de la incorporación de residuos de cosecha de tarwi para la producción de papa y quinua (Anzaldo 2014-2015)




Figura 3. Efecto del cultivo de tarwi (*L. mutabilis*), de la incorporación de su rastrojo y del guano ovino, en la productividad de papa en las ecoregiones “planicie alta y seca” (comunidad Muña Mayu) y “ladera media” (comunidad Tijraska) de Anzaldo, 2015-2016

Letras iguales son estadísticamente similares al 95% de probabilidad

Se aprecia mayor respiración en las parcelas donde se incorporó rastrojo de tarwi, y donde éste se combina con guano, respecto a las parcelas sin incorporación de rastrojo de tarwi. Este comportamiento sugiere que la materia orgánica generada por el rastrojo de tarwi, es un buen substrato para generar una mayor actividad microbiana y consecuentemente una mayor respiración del suelo.

Para corroborar los anteriores resultados en el cultivo de papa, en la campaña 2015-2016, se repitió el estudio anterior donde se incluyó un nuevo tratamiento, que representaba a aquellas parcelas donde no se cultiva tarwi, a manera de testigo local, es decir un tratamiento SIN tarwi y SIN rastrojo a nivel de parcela principal, siendo un tratamiento que no fue considerado en la campaña anterior.

Considerando que fue un año agrícola más seco que el anterior, el efecto del rastrojo solo fue perceptible en la eco región 2 (Tijraska) y no así en la eco

región 1 (Muña Mayu), la cual se caracteriza por tener suelos más superficiales y más proclives a la sequedad, aspecto que probablemente no permitió una adecuada descomposición del rastrojo. Contrariamente, bajo mejores condiciones de suelo como los de Tijraska, pese a la sequía, la descomposición fue mayor, lo que permitió demostrar nuevamente que el rastrojo de tarwi logra mejorar la productividad de la papa (Figura 3), debido a su efecto favorable en el suelo (figuras 4 y 5).

Esta respuesta del rendimiento, muestra que bajo las condiciones de la eco región 2 (Tijraska), un tiempo de 7 a 8 meses es suficiente para lograr descomponer los residuos de tarwi, a tal punto que sus nutrientes estén a disposición de los cultivos del sistema de rotación. Por otro lado, también se aprecia que el guano logra incrementar la productividad de la papa, y este efecto es mayor cuando se acompaña con rastrojo de tarwi.




Figura 4. Tasa de respiración del suelo por efecto de la incorporación de residuos de cosecha de tarwi para la producción de papa en las ecoregiones de “planicie alta y seca” (comunidad Muña Mayu) y “ladera media” (Comunidad Tijraska) de Anzaldo, 2015-2016




Figura 5. Efecto de la incorporación de residuos de cosecha de tarwi en el contenido de potasio y materia orgánica del suelo (A) y en el contenido de nitrógeno y fósforo del suelo (B) (Anzaldo, 2014-2015)

En la misma Figura 3 también se aprecia que en las parcelas donde se cultivó tarwi la productividad de papa fue mayor respecto a las parcelas donde no se cultivó, este aspecto muestra el efecto favorable del tarwi en el sistema de rotación, aún si su rastrojo no es incorporado al suelo.

El efecto del rastrojo de tarwi y el guano ovino sobre la respiración del suelo, durante el desarrollo de los cultivos de papa, se muestra en la Figura 4.

Al igual que los resultados del estudio anterior (Figura 3), las parcelas donde se incorporó rastrojo de tarwi y donde éste se combinó con guano, presentan mayor respiración respecto a las parcelas sin incorporación.

Las condiciones de calor y humedad que se presentaron entre septiembre y febrero, favorecieron la descomposición; aunque, durante el desarrollo de los cultivos, se pudo apreciar pequeñas porciones de rastrojo que no se descompusieron total-

mente, porque no estaban incorporadas de la manera más adecuada. El análisis químico de los suelos (Figura 5) muestra que la incorporación de los residuos de tarwi (rastrojo), logró incrementar el contenido de materia orgánica, nitrógeno (NH₄), fósforo disponible y potasio.

Conclusiones

- El efecto residual de la incorporación de rastrojo de tarwi al suelo, mejora la productividad del cultivo de papa y quinua. En ambos cultivos, la combinación de rastrojo de tarwi con guano es el que genera mayor productividad.
- El rastrojo de tarwi, incorporado al suelo, logra incrementar su respiración lo que sugiere que la materia orgánica generada por el rastrojo, se constituye es un sustrato que genera mayor actividad microbiana.
- En la rotación de cultivos, existe un efecto positivo del tarwi sobre la papa, aún si el rastrojo de esta leguminosa no es incorporada al suelo.
- La incorporación de los residuos de tarwi (rastrojo), incrementó en el suelo, el contenido de materia orgánica, nitrógeno (NH₄), fósforo disponible y potasio.

Referencias citadas

Barrera C. 2015. Evaluación del frijol lupinus (*Lupinus mutabilis*) como abono verde para la producción agroecológica en el municipio de Subachoque Cundinamarca. Tesis Ingeniería en Agroecología. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Facultad de Ingeniería. Bogotá, Colombia. 79 p.

Campbell C., Conkey B., Zentner R., Sellers F., Curtin D. 1996. Long term effects of tillage and crop rotations on soil organic C and total N in a clay soil in south western Saskatchewan. Canada. J. Soil. Sci.76: 395-401.

Cifuentes R., Núñez E., Espinosa H., Alcántar G. 2001. Asociación lupino-maíz en la nutrición fosfatada en un Andosol. Terra Latinoamericana. Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Chapingo, México Vol. 19. Nro. 2. pp. 141-154.

Eiza M., Fioriti N., Studdert G., Echeverría H. 2005. Fracciones de carbono orgánico en la capa arable: efecto de los sistemas de cultivo y fertilización nitrogenada. Ciencia. Suelo. Versión Online. Vol. 23, Nro.1. Buenos Aires, Argentina. pp. 1-12.

Espinoza Y., Lozano Z., Velásquez L. 2007. Efecto de la rotación de cultivos y prácticas de labranza sobre las fracciones de la materia orgánica del suelo. Asociación Interciencia. Caracas, Venezuela. Vol. 32. pp. 554-559.

Follet R. 2001. Soil management concepts and carbon sequestration in crop land soils. Soil Till. Res. 61: 77-92.

Fonte S., Vanek S. 2012. Rutas de intensificación agroecológica para el manejo de la fertilidad del suelo dirigidas a los pequeños agricultores de las zonas alto-andinas. Informe y recomendaciones para la fundación McKnight. 102 p.

Gross R. 1982. El cultivo y la utilización del tarwi *Lupinus mutabilis* Sweet. Estudio FAO: Producción y protección vegetal 36. Roma, Italia.

- Hudson B. 1994. Soil organic matter and available water capacity. Soil and water conservation Society 49 (2):189-194.
- Omay A., Rice C., Maddux L., Gordon W. 1997. Changes in soil microbial and chemical properties under long term crop rotation and fertilization. Soil Sci. Soc. Am. J. 61: 1672-1678.
- Oros R., Lazarte M., Alemán A. 2018. Herramientas metodológicas para analizar la incorporación de nuevos cultivos en sistemas sociales y económicos de alta vulnerabilidad. Revista de Agricultura. Nro. 57. FCAYP-CIF-PROINPA. Cochabamba, Bolivia. *En prensa*.
- Potter K., Tolbert H., Jones O., Matocha J., Morrison J., Unger P. 1998. Distribution and amount of soil organic C in long term management system in Texas. Soil Till. Res. 47: 309-321.
- PROINPA. 2012. Informe anual de proyectos. Agricultura de conservación como un posible camino hacia una mejor gestión de los recursos, productividad y condiciones socio económicas mejoradas en la región andina. Cochabamba, Bolivia. 103 p.
- PROINPA. 2015. Informe compendio 2011-2014. Cochabamba, Bolivia. pp 12 - 19.
- Spedding T., Hamel C., Mehuys G., Madramootoo C. 2004. Soil microbial dynamics in maize growing soil under different tillage and residue management systems. Soil Biology and Biochemistry. 36: 499-512.
- Studdert G., Echeverría H. 2000. Crop rotations and nitrogen fertilization to manage soil organic carbon dynamics. Soil Science Society of America. Journal Abstract. Vol. 64 No. 4: 1496-1503.

Trabajo recibido el 14 de mayo de 2018 - Trabajo aprobado el 19 de junio de 2018

ENSALADA DE TARWI CON PALTA
Tarwix™

Ingredientes:

- 1 palta grande y madura
- 1 lata de **CHUCHUSMUTI TARWIX**
- 100 gr cebolla blanca picada en cuadrados
- 100 gr tomate picado en cuadrados

Aderezo para la ensalada:

- 1 cucharada sopera de vinagre
- 3 cucharas soperas aceite
- Sal al gusto
- 2 ramas de cilantro picado menudo

Mezclar todos los ingredientes y reservar.

Preparación:

En un bol incorporar el Chuchusmuti Tarwix, la cebolla, tomate y el aderezo para la ensalada, mezclar bien.

Añadir la palta pelada y picada en cubos y servir como entrada o acompañamiento del plato principal.



PANASERI

Calle Riverena, zona Colinas de Andalucia
Cel. 77919210 - Web: www.panaseri.com

